

PR-Bus, projektnummer C321001858


Aktiv dødshjælp

Verian for Lægeforeningen

Camilla Kann Fjeldsøe

April 2024

verian 



Om undersøgelsen

Antal interviews: 1540

Metode: Interviews i onlinepanel

Dataindsamling: Fra 16-22. april 2024

Målgruppe: Den danske befolkning på 18 år eller derover, repræsentative i forhold køn, alder, region, uddannelse og parti ved seneste folketingsvalg.

Databehandling: Datamaterialet er vejet efter køn, alder, region, uddannelse og partivalg ved seneste folketingsvalg.

Kreditering: Enhver offentliggørelse af resultater fra undersøgelsen skal ske med angivelse af Verian som kilde.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte:

Camilla Kann Fjeldsøe

Direkte 2616 5458

Hovednr. 3927 2700

E-mail camilla.fjeldsoe@veriangroup.com

Definition af aktiv dødshjælp

Q1: I øjeblikket diskuteres det, om der skal indføres aktiv dødshjælp i Danmark. **Hvilke af disse eksempler, vil du kalde for aktiv dødshjælp?**

Du kan vælge et eller flere svar

En patient, med eksempelvis en alvorlig sygdom eller svært handicap, oplever sit liv som uværdigt eller på anden måde ubærligt. Patienten er i stand til at forstå og forholde sig til sin situation og udtrykker tydeligt ønske om at dø. Lægen imødekommer patientens ønske og giver et dødbringende lægemiddel. Patienten dør af behandlingen.

66%

En patient er uhelbredelig syg og ønsker at få slukket sin livsnødvendige respiratorbehandling. Patienten er i stand til at forstå og forholde sig til sin situation, og ved at hun vil dø, hvis respiratoren slukker. Lægen imødekommer patientens ønske.

60%

En patient har svære lidelser, og døden er nært forestående. For at lindre giver lægen medicin, der får patienten til at sove. Patienten dør af sin sygdom uden at vågne igen.

28%

En patient har svære smerter, og døden er nært forestående. Lægen behandler smerterne med kraftig medicin, som afhjælper smerterne effektivt. Medicinen har som bivirkning, at dødstidspunktet indtræder tidligere.

27%


Ved ikke/ønsker ikke at svare

17%

n: 1540

Holdninger om aktiv dødshjælp


Q2a: Synes du, at det danske sundhedsvæsen skal kunne tilbyde aktiv dødshjælp i følgende situationer: Hvis en person med en ikke-livstruende kronisk sygdom ønsker det?



n: 1540

Holdninger om aktiv dødshjælp


Q2b: Synes du, at det danske sundhedsvæsen skal kunne tilbyde aktiv dødshjælp i følgende situationer: Hvis en person med invaliderende handicap ønsker det?



n: 1540

Holdninger om aktiv dødshjælp

Q2c: Synes du, at det danske sundhedsvæsen skal kunne tilbyde aktiv dødshjælp i følgende situationer: Hvis en person med psykisk sygdom eller depression ønsker det?




n: 1540

Infotekst

Du vil nu blive præsenteret for en række tænkte eksempler om aktiv dødshjælp.

Eksempler om aktiv dødshjælp


Q7: Kan du forestille dig situationer, hvor en kronisk syg person, en person med et invaliderende handicap eller en person med svær psykisk sygdom kan vælge aktiv dødshjælp for ikke at ligge sine nærmeste til last?



n: 1540

Eksempler om aktiv dødshjælp


Q8: Kan du forestille dig situationer, hvor en kronisk syg person, en person med et invaliderende handicap eller en person med svær psykisk sygdom kan blive overbevist af andre om, at aktiv dødshjælp ville være den bedste løsning?



n: 1540

Eksempler om aktiv dødshjælp

Q9: Kan du forestille dig situationer, hvor en person med et invaliderende handicap eller en person med svær psykisk sygdom, der har sagt, at hun/han ønsker aktiv dødshjælp, fortryder, men ikke tør sige det eller har svært ved at sige det højt?



n: 1540

Infotekst

Du vil nu blive præsenteret for de samme behandlinger, som du blev præsenteret for i starten af spørgsmålsrækken om aktiv dødshjælp.

Flere af behandlingerne er lovlige behandlinger og praktiseres i dag i det danske sundhedsvæsen:

✓ En patient har svære smerter, og døden er nært forestående. Lægen behandler smerterne med kraftig medicin, som afhjælper smerterne effektivt. Medicinen har som bivirkning, at dødstidspunktet indtræder tidligere.

Når medicin har en ikke-tilsigtet bivirkning kaldes det en dobbelteffekt. Det er allerede lovligt i Danmark at give smertestillende behandling, selvom det som bivirkning kan forkorte patientens liv. Dette er ikke aktiv dødshjælp.

✓ En patient er uhelbredelig syg og ønsker at få slukket sin livsnødvendige respiratorbehandling. Patienten er i stand til at forstå og forholde sig til sin situation og ved, at hun vil dø, hvis respiratoren slukker. Lægen imødekommer patientens ønske, slukker respiratoren, og patienten dør.

Dette hedder afbrydelse af behandling (nogle gange kaldet passiv dødshjælp) og er allerede lovlig og bliver praktiseret af læger i det danske sundhedsvæsen. Dette er ikke aktiv dødshjælp.

✓ En patient har svære lidelser, og døden er nært forestående. For at lindre giver lægen medicin, der får patienten til at sove. Patienten dør af sin sygdom uden at vågne igen.

Behandlingen går under betegnelsen palliativ sedering og er allerede lovlig og bliver praktiseret af læger i det danske sundhedsvæsen. Dette er ikke aktiv dødshjælp.

En af behandlingerne, som du blev præsenteret for i starten af spørgsmålsrækken om aktiv dødshjælp, er på nuværende tidspunkt ulovlig og bliver ikke praktiseret i Danmark:

✗ En patient, med eksempelvis en alvorlig sygdom eller svært handicap, oplever sit liv som uværdigt eller på anden måde ubærligt. Patienten er i stand til at forstå og forholde sig til sin situation og udtrykker tydeligt ønske om at dø. Lægen imødekommer patientens ønske og giver et dødbringende lægemiddel. Patienten dør af behandlingen.

Behandlingen går under betegnelsen aktiv dødshjælp og er ikke lovlig i Danmark.

Statistisk usikkerhed

De procenttal, der gengives i denne rapport, er behæftet med en vis usikkerhed, da vi ikke har spurgt hele populationen (befolkningen eller målgruppen), men kun et repræsentativt udvalg.

Usikkerheden kan angives med en 95% sikkerhedsgrænse. Det betyder, at det sande procenttal (i hele populationen) med 95% sikkerhed ligger indenfor et givent interval. Dette interval afhænger af både basestørrelsen og procenttallet.

Tabellerne til højre viser basestørrelserne for undersøgelsen i denne rapport samt usikkerheden for en række forskellige basestørrelser og procenttal.

Et eksempel: Hvis basestørrelsen er 500, er usikkerheden for et resultat på 75% på +/-3,8 procentpoint – se markering i tabel til højre. Dvs. at resultatet i hele populationen med 95% sikkerhed ligger mellem 71,2% og 78,8%.

Basestørrelser i denne undersøgelse

	Basestørrelse
Alle	1.540
Mand	759
Kvinde	781
18-35 år	415
36-59 år	619
60 år +	506
Rød opposition	312
Regering	665
Blå opposition	330
Hovedstaden	491
Sjælland	222
Syddanmark	322
Midtjylland	350
Nordjylland	156

Usikkerhed (95%) i procentpoint for forskellige basestørrelser og procenttal

	Base- størrelse	Procenttal									
		5% + 95%	10% + 90%	15% + 85%	20% + 80%	25% + 75%	30% + 70%	35% + 65%	40% + 60%	45% + 55%	50%
50		6,0	8,3	9,9	11,1	12,0	12,7	13,2	13,6	13,8	13,9
75		4,9	6,8	8,1	9,1	9,8	10,4	10,8	11,1	11,3	11,3
100		4,3	5,9	7,0	7,8	8,5	8,9	9,3	9,6	9,8	9,8
150		3,5	4,8	5,7	6,4	6,9	7,3	7,6	7,8	8,0	8,0
200		3,0	4,2	4,9	5,5	6,0	6,4	6,6	6,8	6,9	6,9
250		2,7	3,7	4,4	5,0	5,4	5,7	5,9	6,1	6,2	6,2
300		2,5	3,4	4,0	4,5	4,9	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7
400		2,1	2,9	3,5	3,9	4,2	4,5	4,7	4,8	4,9	4,9
500		1,9	2,6	3,1	3,5	3,8	4,0	4,2	4,3	4,4	4,4
600		1,7	2,4	2,9	3,2	3,5	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0
700		1,6	2,2	2,7	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7
800		1,5	2,1	2,5	2,8	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
900		1,4	2,0	2,3	2,6	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3
1.000		1,4	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1
1.200		1,2	1,7	2,0	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8
2.000		1,0	1,3	1,6	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
2.500		0,9	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0